

EI

J. by Dialog

Pressurised dispenser for cosmetic skin care and cleansing foam - containing transparent monophase composition consisting of propellant gas and aqueous solution of nonionic and amphoteric surfactants

Patent Assignee: L'OREAL SA

Inventors: MAURIN V

Patent Family

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
EP 792632	A1	19970903	EP 97400242	A	19970203	199740	B
WO 9731615	A1	19970904	WO 97FR206	A	19970203	199741	
FR 2745496	A1	19970905	FR 962628	A	19960301	199743	
EP 792632	B1	19980506	EP 97400242	A	19970203	199822	
DE 69700006	E	19980610	DE 600006	A	19970203	199829	
			EP 97400242	A	19970203		
ES 2116818	T3	19980716	EP 97400242	A	19970203	199835	
JP 10506654	W	19980630	JP 97530660	A	19970203	199836	
			WO 97FR206	A	19970203		
US 5888478	A	19990330	US 97808416	A	19970228	199920	
BR 9702102	A	19990720	BR 972102	A	19970203	199940	
			WO 97FR206	A	19970203		
JP 2988730	B2	19991213	JP 97530660	A	19970203	200004	
			WO 97FR206	A	19970203		
KR 99008240	A	19990125	WO 97FR206	A	19970203	200015	
			KR 97707766	A	19971101		
RU 2152782	C2	20000720	RU 97119623	A	19970203	200064	
			WO 97FR206	A	19970203		
KR 241586	B1	20000401	WO 97FR206	A	19970203	200124	
			KR 97707766	A	19971101		

Priority Applications (Number Kind Date): FR 962628 A (19960301)

Cited Patents: 2. journal ref.; AU 627666; CA 1002256; EP 194097 ; EP 213827 ; EP 304713 ; EP 577506 ; EP 586295 ; EP 676188 ; JP 1117817; JP 63185911; US 5156833 ; US 5167950 ; US 5429815 ; WO 9309761; WO 9505796; AU 7662

BEST AVAILABLE COPY

Patent Details

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes

632	A1	F	13	A61K-007/00	
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE					
WO 9731615	A1	F	25		
Designated States (National): BR CA CN JP KR PL RU					
FR 2745496	A1		23	A61K-007/50	
EP 792632	B1	F	16	A61K-007/00	
Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE					
DE 69700006	E			A61K-007/00	Based on patent EP 792632
ES 2116818	T3			A61K-007/00	Based on patent EP 792632
JP 10506654	W		25	A61K-007/00	Based on patent WO 9731615
US 5888478	A			A61K-007/00	
BR 9702102	A			A61K-007/00	Based on patent WO 9731615
JP 2988730	B2		11	A61K-007/00	Previous Publ. patent JP 10506654
					Based on patent WO 9731615
KR 99008240	A			A61K-007/50	Based on patent WO 9731615
RU 2152782	C2			A61K-007/07	Based on patent WO 9731615
KR 241586	B1			A61K-007/50	

Abstract:

EP 792632 A

Pressurised vessel equipped with a distributor head and containing a transparent monophasic composition comprising (A) 0.5-10 wt. % of a propellant gas and (B) 90-99.5 wt. % of an aqueous composition comprising a mixture of surfactants selected from nonionic and amphoteric surfactants, wherein the vessel delivers a foam when the distributor head is activated.

USE - For dispensing a foam serving as a care and cleansing agent for the human skin, particularly for removing make-up.

ADVANTAGE - The compositions are free from low alcohols and give soft foams having an efficient yet gentle cleansing and make-up removal action on the skin.

Dwg.0/0

Derwent World Patents Index

© 2002 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 11449167

BEST AVAILABLE COPY

FI



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 792 632 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
03.09.1997 Bulletin 1997/36

(51) Int Cl.⁶: **A61K 7/00, A61K 7/50**

(21) Numéro de dépôt: **97400242.0**

(22) Date de dépôt: **03.02.1997**

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

(72) Inventeur: **Maurin, Véronique**
75016 Paris (FR)

(30) Priorité: **01.03.1996 FR 9602628**

(74) Mandataire: **Lhoste, Catherine**
L'OREAL,
D.P.I.,
90 rue du Général Roguet
92583 Clichy Cédex (FR)

(71) Demandeur: **L'OREAL**
75008 Paris (FR)

(54) **Dispositif pressurisé transparent à composition moussante comprenant des tensioactifs non-ioniques et amphotères**

(57) L'invention a pour objet de nouveaux dispositifs pressurisés transparents comprenant une composition cosmétique transparente, stable, moussante, très douce, pressurisée par un gaz hydrocarboné, exempt d'al-

cool monohydrique en C₁-C₃ et comprenant des tensioactifs non-ioniques et amphotères. De telles compositions permettent le nettoyage et le démaquillage de la peau avec douceur et efficacité.

EP 0 792 632 A1

Description

L'invention a pour objet de nouveaux dispositifs pressurisés comprenant une composition, notamment une composition cosmétique ou dermatologique, et en particulier une composition nettoyante et démaquillante.

L'utilisateur attend d'une composition démaquillante qu'elle permette d'ôter toutes sortes de produits de maquillage: rouge à lèvres, poudre, ombre à paupières, fond de teint etc..., sans abimer la peau et en la laissant propre et douce. Le nettoyage de la peau est très important pour le soin du visage. Il doit être le plus performant possible car les résidus gras tels que l'excès de sébum, les restes des produits cosmétiques utilisés quotidiennement, notamment les produits de maquillage, et en particulier les produits « waterproof » résistants à l'eau, s'accumulent dans les replis cutanés et peuvent obstruer les pores de la peau et entraîner l'apparition de boutons. Les démaquillants habituels sont généralement sous la forme d'un gel, d'une lotion ou d'une crème. Toutefois, le marché attend de nouvelles formes de produits, à la fois plus esthétiques et éventuellement ludiques. Pour répondre à cette attente, de nouveaux démaquillants et nettoyants pour la peau sont apparus, sous la forme de dispositifs pressurisés transparents, contenant une composition nettoyante et démaquillante transparente, monophasique et moussante.

On connaît, en particulier par le brevet américain US 3,719,752, des compositions pour application topique, conditionnées en bouteilles pressurisées, moussantes, transparentes, monophasiques et stables. Ces compositions comprennent un tensioactif et un gaz propulseur dans un milieu hydroalcoolique. L'alcool est de préférence un alcool monohydrique en C₁-C₃. Toutefois l'emploi d'alcool, et en particulier d'éthanol, dans de telles compositions implique un risque lié à l'inflammabilité. On a par conséquent cherché à éviter l'emploi d'alcool monohydrique en C₁-C₃ dans les compositions nettoyantes pour le visage.

Par ailleurs, le document WO95/05796 décrit un dispositif pressurisé comprenant une composition monophasique, fluide, exempte d'alcool monohydrique, constituée d'un gaz propulseur hydrocarboné et d'un concentré aqueux comprenant des sels d' α -oléfine sulfonate, des bétaines et des alkylpolyglucosides, contenue dans une bouteille transparente. Toutefois ce dispositif n'est pas dépourvu d'inconvénients: la composition qu'il renferme n'est pas stable dans le temps; en particulier on voit apparaître au stockage un halo d'agréats en suspension dans la composition. La bouteille pressurisée étant transparente, une telle instabilité n'est pas acceptable pour le consommateur.

Le document EP-676188 révèle un dispositif analogue, comprenant une composition monophasique, fluide, exempte d'alcool monohydrique, constituée d'un gaz propulseur et d'un concentré aqueux. Le gaz propulseur comprend un mélange de diméthyléther et de gaz hydrocarboné; le concentré aqueux comprend des tensioactifs et en outre un agent de couplage. On sait par ailleurs que le diméthyléther est un gaz inflammable, de très bas point d'éclair. Son utilisation accroît donc les risques liés aux dispositifs pressurisés, aussi bien pour le site de production que pour l'utilisateur de ce dispositif.

Le brevet canadien CA-1002256 révèle un système pressurisé transparent, uniforme utilisable pour la distribution de produits cosmétiques aqueux transparents, dont des produits démaquillants. L'utilisation comme tensioactif d'un sel de triéthanolamine d'un acide acyl lactylique permet d'obtenir un système dans lequel le gaz propulseur est complètement dissout dans la phase aqueuse.

Le brevet américain US 3,840,465 révèle un système pressurisé transparent comprenant une composition transparente moussante, exempte d'alcool. Cette composition comprend une solution aqueuse d'un tensioactif moussant, qui est généralement anionique, dans laquelle est dispersé un propulseur liquide grâce à un second tensioactif, soluble dans le propulseur et insoluble dans l'eau.

Les compositions décrites dans l'ensemble de ces documents et utilisées pour le nettoyage de la peau sont essentiellement constituées de tensioactifs anioniques, qui détruisent le film hydro-lipidique de la peau et laissent la peau propre mais rêche.

Aussi, c'est avec étonnement que la demanderesse a découvert de nouveaux dispositifs comprenant une composition cosmétique transparente, stable, moussante, très douce, pressurisée par un gaz hydrocarboné exempt d'alcool monohydrique en C₁-C₃, à base de tensioactifs non-ioniques et comprenant éventuellement un ou plusieurs tensioactifs amphotères.

L'invention a pour objet un dispositif pressurisé comprenant

- (i) une bouteille pressurisée munie d'une tête de distribution,
- (ii) une composition transparente monophasique contenue dans la bouteille et comprenant

A- 0,5 à 10% d'un gaz propulseur,

B- 90 à 99,5% d'une composition aqueuse,

ce dispositif étant apte à distribuer une mousse lorsque l'on actionne la tête de distribution, caractérisé en ce que la composition B comprend un mélange de tensioactifs choisis parmi les tensioactifs non-ioniques et les tensioactifs amphotères.

Lorsque l'on actionne le bouton-poussoir faisant partie de la tête de distribution, les compositions de l'invention sont distribuées sous la forme d'une mousse crémeuse qui nettoie la peau sans l'agresser. L'absence de tensioactifs anioniques et cationiques dans les compositions distribuées par ce dispositif a pour effet l'obtention d'une mousse d'un produit extrêmement doux pour la peau et pour les muqueuses (lèvres, intérieur des paupières), ce qui permet son utilisation pour le nettoyage et le démaquillage du visage, en particulier le démaquillage des yeux.

De façon préférentielle, les bouteilles pressurisées utilisées dans l'invention sont transparentes. De telles bouteilles sont bien connues de l'homme du métier et d'utilisation courante, on pourra par exemple se référer à la demande de brevet WO95/05796 au sujet de ces bouteilles. Elles mettent particulièrement en valeur le caractère surprenant de l'invention : au travers de la bouteille on observe une émulsion transparentes, ayant une fluidité comparable à celle de l'eau, ladite émulsion étant restituée sous la forme d'une mousse onctueuse au travers du moyen de distribution, et non sous la forme d'un spray comme on s'y attend à priori. On peut utiliser n'importe quel moyen de distribution de bouteille aérosol connu de l'homme du métier. Une bouteille et un moyen de distribution pouvant être utilisés dans la présente invention est par exemple représenté dans la demande de brevet FR-95-12788.

Le mot «transparent» signifie qu'au travers de la bouteille contenant la composition on peut distinguer les caractères imprimés sur une page de journal placée derrière cette bouteille. Ce terme signifie également qu'un échantillon de 10cm d'épaisseur de la composition a une transmission maximum de la lumière d'au moins 4% dans n'importe quelle longueur d'onde comprise entre 200nm et 800nm.

Plus particulièrement, l'invention a pour objet un dispositif pressurisé tel que décrit ci-dessus caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend :

- (a) au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique,
- (b) au moins un tensioactif épaississant non-ionique.

De préférence, la composition aqueuse B comprend 1 à 25% en poids d'au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique.

De façon avantageuse, la composition aqueuse B comprend 1 à 30% d'au moins un tensioactif épaississant non-ionique.

De préférence, la composition de B est ajustée, et en particulier le choix et le pourcentage du ou des épaississants, de telle sorte que cette composition B a une viscosité Brookfield comprise entre 5 et 200mPa.s, et de préférence entre 10 et 150mPa.s.

On peut utiliser dans les dispositifs selon l'invention tous les gaz propulseurs connus pour de telles applications. On peut citer en particulier les gaz hydrocarbonés, comme par exemple le propane, le n-butane, l'isobutane et leurs mélanges ; les gaz fluorés comme par exemple le chlorodifluoro méthane, le dichlorodifluorométhane, le difluoroéthane, le chlorodifluoroéthane, le dichlorotétrafluoroéthane etc... et leurs mélanges; l'azote, l'air et le dioxyde de carbone et leurs mélanges peuvent également être utilisés comme gaz propulseurs dans la présente invention. De façon préférentielle, on utilise dans la présente invention des gaz hydrocarbonés ayant de 2 à 6 atomes de carbone. Parmi les compositions de l'invention, on préfère celles ayant de 1,5 à 4%, en poids par rapport au poids total de la composition, de gaz propulseur.

Les tensioactifs émulsionnants utilisables dans la présente invention sont préférentiellement choisis parmi ceux ayant une balance HLB comprise entre 12 et 18. On calcule la balance HLB (balance hydrophile-lipophile) d'un émulsionnant suivant la formule suivante :

$$HLB = \frac{100-L}{5}$$

dans laquelle L représente le pourcentage en poids du groupement lipophile par rapport au poids de la molécule entière.

Préférentiellement, ces tensioactifs sont choisis parmi les produits d'addition de 1 à 200 moles d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène sur des esters partiels de polyols ayant 2 à 16 atomes de carbone et d'acides gras ayant 12 à 22 atomes de carbone. Avantageusement, on choisit des produits tels que décrits ci-dessus ayant un taux d'estérification inférieur ou égal à 2.


Les tensioactifs épaississants non-ioniques utilisables dans la présente invention sont préférentiellement choisis parmi :

- α- les C₁-C₆ alcanolamides d'acides C₈-C₂₂ alkyl éther carboxyliques ;
- β- les produits d'addition de 10 à 300 moles d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène sur des esters partiels de polyols ayant 2 à 16 atomes de carbone et d'acides gras ayant 12 à 22 atomes de carbone. Parmi cette famille de produits, on choisit préférentiellement ceux ayant un taux d'estérification supérieur ou égal à 2 ;
- γ- les alcools gras en C₁₂-C₂₂ polyoxyéthylénés et/ou polyoxypropylénés et/ou polyglycérólés,

δ- les esters gras en C₁₂-C₂₂ de polyoxyéthylène et/ou de polyoxypropylène et/ou de polyglycérol,
 ε- les polymères blocs de polyéthylène glycol et/ou de polypropylène glycol.

Avantageusement, les compositions selon l'invention comprennent au moins deux tensioactifs épaississants appartenant chacun à deux familles différentes, parmi les familles d'épaississants α à ε décrites ci-dessus.

Par C₁-C₆ alcanolamide d'acide C₈-C₂₂ alkyl éther carboxylique, on désigne des produits répondant à la formule I :



dans laquelle R représente une chaîne alkyle ayant 8 à 30 atomes de carbone, R' représente une chaîne alkyle ayant 1 à 6 atomes de carbone, Y représente un radical éthylène di-yle ou propylène 1,3-di-yle et n représente un nombre entier allant de 0 à 100.

Par exemple, R peut être choisi parmi les radicaux stéaryle, oléyle, ricinoléyle, linoléyle, lauryle, myristyle, capryle, palmityle ou parmi des mélanges de radicaux alkyles en C₈-C₂₂.

R' peut par exemple être choisi parmi les radicaux méthyle, éthyle, n- propyle, isopropyle, tertiairebutyle, n-hexyle.

Parmi les esters partiels de polyols utilisables dans la présente invention on peut citer particulièrement ceux qui dérivent du glycol, du glycérol et des sucres, comme par exemple du glucose, du fructose, du maltose, du ribose, de l'arabinose, du xylose, du lyxose, du ribulose, du xylulose, de l'allose, de l'altrose, du mannose, du gulose, du galactose, du saccharose, du sorbitol.

Parmi les tensioactifs épaississants utilisables dans la présente invention on peut citer par exemple les produits suivants: l'huile de ricin, les monoéthanolamides d'acide alkyl (C₁₃, C₁₅) éther carboxylique (2 OE), la monoéthanolamide d'acide éther carboxylique (50 OE), les mono- et di-glycérides de suif oxyéthylénés (200 OE), les mono- et di-glycérides de suif oxyéthylénés (82 OE), les mono- et di-glycérides de coprah oxyéthylénés (78 OE), les triglycérides d'acide stéarique et hydroxystéarique (40 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol (100 OE), l'alcool dodécanediol polyglycérolé (3,5 moles) et de façon plus générale les produits décrits dans le brevet FR-2091516, l'octyl-2 dodécanol oxyéthyléné (250 OE), l'alcool stéarylique oxyéthyléné (100 OE), l'alcool oléique oxyéthyléné (50 OE), le di-oléate de polyéthylène glycol (50 OE), le palmitate de glycérol oxyéthyléné (200 OE), le tri-isostéarate de sorbitane oxyéthyléné (160 OE), le tri-isostéarate de sorbitane oxyéthyléné (200 OE), le stéarate de polyéthylène glycol (150 OE), le di-oléate de méthyl glucose oxyéthyléné (120 OE), le tétra-stéarate de penta-érythrityle oxyéthyléné (150 OE), le di-oléate de polyéthylène glycol (55 OE), l'undécylénate de polyéthylène glycol (300 OE), le di-stéarate de polyéthylène glycol (150 OE),

Parmi les esters de polyols polyoxyalkylénés utilisables comme tensioactifs émulsionnants on peut citer par exemple les produits suivants: le mono-undécylénate de glycérol oxyéthyléné (7 OE), le monostéarate de glycérol oxyéthyléné (15 OE), le mono-laurate de glycérol oxyéthyléné (20 OE), le di-laurate de glycérol oxyéthyléné (20 OE), le stéarate de di-glycérol oxyéthyléné (4 OE), le cocoate de glycérol oxyéthyléné (7 OE), le pyrrolidone carboxylate de monoisostéarate de glycérol oxyéthyléné (25 OE), le mono stéarate de glycérol oxyéthyléné (20 OE), le monostéarate de glycérol oxyéthyléné (30 OE), le stéarate de di-glycérol oxyéthyléné (4 OE), les mono- et di-glycérides de coprah oxyéthyléné (30 OE), le lanolate de sorbitane oxyéthyléné (40 OE), le mono-oléate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le tri-oléate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le mono-palmitate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le mono-stéarate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), l'undécylénate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), l'undécylénate de sorbitane oxyéthyléné (18 OE), l'hexa-stéarate de sorbitane oxyéthyléné (6 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (44 OE), le tétra-oléate de sorbitane oxyéthyléné (30 OE), le mono-stéarate de sorbitane oxyéthyléné (4 OE), l'oléate de sorbitane oxyéthyléné (40 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (4 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (10 OE), le tétra-oléate de sorbitane oxyéthyléné (40 OE), le cocoate de butyl glucoside oxyéthyléné (3 OE), le di-stéarate de méthyl glucoside oxyéthyléné (20 OE), le mono-laurate de méthyl glucoside oxyéthyléné (20 OE), le benzoate de méthyl glucose oxyéthyléné (20 OE), les esters de tri-glycérides de ricin et de saccharose oxyéthylénés (1,4 OE), les esters de tri-glycérides de ricin et de saccharose oxyéthylénés (2 OE), le sesquistéarate de méthyl glucose oxyéthyléné (20 OE), le di-stéarate de méthyl glucose oxyéthyléné (20 OE), le mono-stéarate de butanediol oxyéthyléné (4 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol oxyéthyléné (50 OE), le di-stéarate de polyéthylène glycol, le myristate de polyéthylène glycol (8 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol (8 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol (20 OE), le laurate de polyéthylène glycol (6 OE), le di-stéarate de polyéthylène glycol (8 OE), le di-laurate de polyéthylène glycol (8 OE), le mono-oléate de polyéthylène glycol (8 OE), le di-heptanoate de tétra-éthylène glycol, le di-oléate de polyéthylène glycol (8 OE), l'oléate de polypropylène glycol (26 OE), le di-polyhydroxystéarate (6 hydroxy) de polyéthylène glycol (30 OE), le stéarate de polyéthylène glycol

(40 OE), le di-laurate de polyéthylène glycol (8 OE).

L'ensemble des produits utilisés dans la présente invention sont disponibles commercialement :

- 5 - les C_1 - C_6 alcanolamides d'acides C_8 - C_{22} alkyl éther carboxylique sont par exemple commercialisés par la société HENKEL sous la marque COMPERLAN, ou par la société CHEM Y sous le nom de marque AMINOL ;
- les produits d'addition d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène sur des esters partiels de polyols et d'acides gras sont par exemple commercialisés par la société BASF sous la marque CREMOPHOR, ou par la société AMERCHOL sous la marque GLUCAMATE ;
- 10 - les alcools gras en C_{12} - C_{22} polyoxyéthylénés et/ou polyoxypropylénés et/ou polyglycérólés sont par exemple commercialisés par la société ICI sous la marque BRIJ,
- les esters gras en C_{12} - C_{22} de polyoxyéthylène et/ou de polyoxypropylène et/ou de polyglycéról sont par exemple commercialisés par la société ICI sous la marque MYRJ,
- les polymères blocs de polyéthylène glycol et/ou de polypropylène glycol sont par exemple commercialisés par la société ICI sous la marque SYNPERONIC.

15

De façon préférentielle, l'invention a pour objet un dispositif pressurisé tel que décrit ci-dessus caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend :

20

- (a) 2 à 15% et encore plus préférentiellement de 3 à 12% en poids d'au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique,
- (b) 2 à 15% en poids d'au moins un tensioactif épaississant non-ionique,

25

Les compositions de la présente invention comprennent de préférence de 3 à 10% d'au moins un tensio-actif épaississant tel que défini ci-dessus. En pratique, la quantité d'épaississant utilisée est adaptée pour satisfaire le critère de viscosité donné ci-dessus. Une quantité excessive de ce type de composé peut entraîner un épaississement important de la composition de l'invention, qui devient alors difficile à distribuer en aérosol. Une quantité trop faible présente l'inconvénient de mettre en péril la stabilité de la composition.

30

Avantageusement les compositions B comprennent en outre au moins un alkylpolyglucoside comme tensio-actif non-ionique. De façon préférentielle, cet alkylpolyglucoside représente de 0,01 à 10% en poids de B.

De préférence, la composition aqueuse B comprend en outre au moins un tensioactif amphotère, avantageusement en quantités allant de 0,01 à 15% en poids de B et encore plus préférentiellement de 1 à 5% en poids de B.

Selon une composition préférée, B comprend :

35

- 1 à 25% en poids d'au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique,
- 1 à 30% en poids d'au moins un tensioactif épaississant non-ionique,
- 0,01 à 10% en poids d'au moins un alkylpolyglucoside,
- 0,01 à 15% en poids d'au moins un tensioactif amphotère.

40

Les compositions B peuvent comprendre jusqu'à environ 98% d'eau. Habituellement on entend par eau de l'eau pure déminéralisée. Toutefois tout ou partie de l'eau utilisée dans les compositions B peut éventuellement être choisie parmi les eaux minérales ou thermales. En général, une eau minérale est propre à la consommation, ce qui n'est pas toujours le cas d'une eau thermale. Chacune de ces eaux contient, entre autre, des minéraux solubilisés et des oligo-éléments. Ces eaux sont connues pour être employées à des fins de traitement spécifique selon les oligo-éléments et les minéraux particuliers qu'elles contiennent, tels que l'hydratation et la désensibilisation de la peau ou le traitement de certaines dermatoses. Par eaux minérales ou thermales, on désignera non seulement les eaux minérales ou thermales naturelles, mais également des eaux minérales ou thermales naturelles enrichies en constituants minéraux et/ou en oligo-éléments supplémentaires, ainsi que des solutions aqueuses minérales et/ou oligo-élémentaires préparées à partir d'eau purifiée (déminéralisée ou distillée).

45

50

Une eau thermale ou minérale naturelle utilisée selon l'invention peut, par exemple être choisie parmi l'eau de Vittel, les eaux du bassin de Vichy, l'eau d'Uriage, l'eau de la Roche Posay, l'eau de la Bourboule, l'eau d'Enghien-les-Bains, l'eau de Saint Gervais-les-Bains, l'eau de Nérís-les-Bains, l'eau d'Allevard-les-Bains, l'eau de Digne, l'eau de Maizières, l'eau de Neyrac-les-Bains, l'eau de Lons-le-Saunier, les Eaux Bonnes, l'eau de Rochefort, l'eau de Saint Christau, l'eau des Fumades et l'eau de Tercis-les-bains, l'eau d'Avene.

55

Les compositions cosmétiques ou dermatologiques de l'invention peuvent, en outre, contenir des adjuvants habituels dans les domaines concernés tels que les conservateurs, les antioxydants, les parfums, les filtres, les matières colorantes, les actifs hydrophiles ou lipophiles,.

Les actifs pour la peau peuvent être des actifs anti-âge, des actifs anti-rides, des hydratants ou des humectants, des actifs dépigmentants, des actifs anti-radicaux libres (espèces radicalaires de l'oxygène), des actifs nutritifs, des

actifs protecteurs, des actifs restructurants, des actifs raffermissants, des actifs antiacnéiques, des actifs exfoliants, des actifs émoullissants ou encore des actifs traitants des maladies de peau comme les mycoses, les dermites, le psoriasis, etc. Ces actifs sont utilisés, selon leur nature, dans les proportions habituelles et par exemple de 0,01 % à 10 % en poids par rapport au poids total de la composition.

- 5 Comme actifs anti-acnéiques, anti-âge, anti-ride, hydratants, exfoliants, on peut citer plus particulièrement les α -hydroxy-acides (acides glycolique, lactique, malique, citrique...).
- Comme anti-oxydants on peut citer par exemple les sulfites.

Exemples :

10

Les exemples suivants sont donnés à titre d'illustration de l'invention et n'ont pas de caractère limitatif.

Des compositions nommées B₁ à B₁₆ ont été préparées conformément aux informations données dans le tableau I. Ces compositions sont ensuite introduites dans une bouteille pressurisée munie d'une tête de distribution dans laquelle on introduit un gaz pressurisé. L'ensemble est agité de façon à obtenir un mélange homogène des deux

15

phases initiales. Les dispositifs sont évalués dans le tableau I.

Dans le tableau I :

Toutes les quantités sont données en pourcentage en poids de matière active par rapport au poids total de la composition.

20 Le tensio-actif amphotère N-cocoyl amidoéthyl, N-éthoxycarboxyméthyl glycinate de sodium est commercialisé sous le nom de «Miranol C2M» par la société Rhône-Poulenc, le «Plantaren 2000», commercialisé par la société Henkel, est un mélange d'alkyl (C₈/C₁₀/C₁₂/C₁₄/C₁₆ 29/37/23/9/2) polyglucosides, «TWEEN 20» désigne le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE) (tensio-actif non-ionique) commercialisé par la société ICI. A l'exception de l'eau de Lucas, l'eau employée dans les exemples est une eau déminéralisée.

25 On a évalué la viscosité des compositions aqueuses B₁ à B₁₆ en mPa.s, puis on a conditionné ces compositions aqueuses dans des bouteilles pressurisées transparentes en introduisant dans ces bouteilles 97% en poids de la composition et 3% en poids d'isobutane. On a ensuite mesuré la transparence et la stabilité, après plusieurs mois de stockage à température ambiante, de ces dispositifs pressurisés.

La viscosité est donnée en mPa.s. Elle est mesurée à 25°C à l'aide d'un viscosimètre Brookfield dont la vitesse du module tournant (module I) est fixée à 5 tours/min.

30

- la transparence est notée +, 0, ou - :
+ = transparent, 0 = présence d'un halo, - = trouble
- la stabilité est notée 0 ou 1 : 1 = stable, 0 = instable

35 Les différents épaississants sont désignés E₁ à E₁₀ :

- E₁ : mono éthanolamide d'acides de Coprah
- E₂ : huile de ricin
- E₃ : alcool oléique OE (50 OE)
- 40 E₄ : amide d'acide stéarique (C₁₆/C₁₈ 30/70) (50 OE)
- E₅ : di-oléate de méthyl glucoside (120 OE)
- E₆ : Tri-isostéarate de sorbitane oxyéthyléné (160 OE)
- E₇ : alcool dodécanediol polyglycérolé (3,5 moles)
- E₈ : monostéarate de PEG (100 OE)
- 45 E₉ : polymère séquencé de polyoxyéthylène et de polyoxypropylène (OE/OP/OE 98/67/98)
- E₁₀ : glycéride de palme oxyéthyléné (200 OE) et glycéride de coprah oxyéthyléné (70 OE) (80/20)
- 50 E₁₁ : alcool cétylstéarylique (C₁₆/C₁₈) oxyéthyléné (60 OE) éther de myristyl glycol.

On remarque que toutes les compositions à l'exception de B₃ sont transparentes et ne présentent pas de halo, aussi bien au moment de leur préparation qu'après plusieurs mois de stockage. L'exemple B₃ ne fait pas partie de l'invention.

55

Tableau I

	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	B ₇	B ₈
<u>Epaississant</u>	E ₁ /1% E ₂ /0,9% E ₁₀ /3,5%	E ₁ /0,75% E ₂ /0,9% E ₁₀ /3,5%	E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1% E ₁₁ /0,5%	E ₁ /1,3% E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1%	E ₁ /1% E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1%	E ₁ /1,5% E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1%	E ₁ /2% E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1%	E ₁ /1% E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1%
Emulsionnant Tween 20	4 %	5 %	6 %	10 %	11 %	6 %	6 %	6 %
Miranol C2M	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	---	3,8 %
Plantareen 2000	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	---	2,5 %	2,65 %	2,65 %
Glycérol	4	4	0	4	4	4	4	4
Acide citrique	2	2	2	2	2	2	2	2
Phénoxy-2 éthanol	1	1	1	1	1	1	1	1
parfum	---	1	0,8	0,8	0,8	---	0,6	0,6
Eau de Lucas	---	---	---	5	---	---	---	---
Eau	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100
Viscosité	66 - 70	90 - 96	16 - 22	50 - 51	14 - 20	88 - 94	72 - 78	36 - 40
Transparence	+	+	0	+	+	+	+	+
Stabilité	1	1	0	1	1	1	1	1

Tableau I (suite)

	B ₉	B ₁₀	B ₁₁	B ₁₂	B ₁₃	B ₁₄	B ₁₅	B ₁₆
Epaississant	E ₉ /0,5% E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1%	E ₂ /0,9% E ₆ /0,5% E ₁₀ /2,1%	E ₇ /0,77% E ₂ /0,9% E ₁₀ /2,1%	E ₂ /0,9% E ₈ /0,5% E ₁₀ /2,1%	E ₂ /0,9% E ₆ /1% E ₁₀ /2,1%	E ₂ /0,9% E ₃ /1% E ₁₀ /2,1%	E ₂ /0,9% E ₄ /0,5% E ₁₀ /2,1%	E ₂ /1,8% E ₁₀ /2,1%
Tween 20	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
Miranol	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %
Plantareen	2,5 %	2,65 %	2,65 %	2,65 %	2,65 %	2,65 %	2,65	2,65 %
Glycérol	---	---	---	---	---	---	---	---
Acide citrique	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Phénoxy-2 éthanol	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
Parfum	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %
Eau de lucas	---	---	---	---	---	---	---	---
Eau	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100	qsp 100
Viscosité	20 -26	14 - 22	16 - 20	10 - 18	18 - 22	12 - 20	14 - 18	6 -12
Transparence	+	+	+	+	+	+	+	+
Stabilité	1	1	1	1	1	1	1	1

Revendications

1. Dispositif pressurisé comprenant
 - (i) une bouteille pressurisée munie d'une tête de distribution,
 - (ii) une composition transparente monophasique comprenant
 - A- 0,5 à 10% en poids d'un gaz propulseur,
 - B- 90 à 99,5% en poids d'une composition aqueuse,ce dispositif étant apte à distribuer une mousse lorsque l'on actionne la tête de distribution, caractérisé en ce que la composition B comprend un mélange de tensioactifs choisis parmi les tensioactifs non-ioniques et les tensioactifs amphotères.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la bouteille pressurisé est transparente.
3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend :
 - (a) au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique,
 - (b) au moins un tensioactif épaississant non-ionique.
4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend 1 à 25% d'au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique.
5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend 1 à 30% d'au moins un tensioactif épaississant non-ionique.
6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition B a une viscosité Brookfield comprise entre 5 et 200mPa.s.
7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend de 1,5 à 4% de gaz propulseur.
8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le gaz est choisi parmi les gaz hydrocarbonés ayant 2 à 6 atomes de carbone.
9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 8, caractérisé en ce que le tensio-actif émulsionnant est choisi parmi ceux ayant une balance HLB comprise entre 12 et 18.
10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 9, caractérisé en ce que le tensio-actif émulsionnant est choisi parmi les produits d'addition de 1 à 200 moles d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène sur des esters partiels de polyols ayant 2 à 16 atomes de carbone et d'acides gras ayant 12 à 22 atomes de carbone.
11. Dispositif selon la revendications 10, caractérisé en ce que le tensio-actif émulsionnant a un taux d'estérification inférieur ou égal à 2.
12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 11, caractérisé en ce que le tensio-actif épaississant est choisi parmi :
 - α- les C₁-C₆ alcanolamides d'acide C₈-C₂₂ alkyl éther carboxylique ;
 - β- les produits d'addition de 10 à 300 moles d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène sur des esters partiels de polyols ayant 2 à 16 atomes de carbone et d'acides gras ayant 12 à 22 atomes de carbone.
 - γ- les alcools gras en C₁₂-C₂₂ polyoxyéthylénés et/ou polyoxypropylénés et/ou polyglycérolés,
 - δ- les esters gras en C₁₂-C₂₂ de polyoxyéthylène et/ou de polyoxypropylène et/ou de polyglycérol,
 - ε- les polymères blocs de polyéthylène glycol et/ou de polypropylène glycol.
13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend au moins deux

tensioactifs épaississants appartenant chacun à deux familles différentes, choisies parmi les familles d'épaississants α à ϵ .

14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 10 à 13, caractérisé en ce que les polyols sont choisis parmi le glycol, le glycérol, le glucose, le fructose, le maltose, le ribose, l'arabinose, le xylose, le lyxose, le ribulose, le xylulose, l'allose, l'altrose, le mannose, le gulose, le galactose, le saccharose, le sorbitol.
15. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 14, caractérisé en ce que le tensioactif épaississant est choisi parmi l'huile de ricin, les monoéthanolamides d'acide alkyl (C_{13} , C_{15}) éther carboxylique (2 OE), la monoéthanolamide d'acide éther carboxylique (50 OE), les mono- et di-glycérides de suif oxyéthylénés (200 OE), les mono- et di-glycérides de suif oxyéthylénés (82 OE), les mono- et di-glycérides de coprah oxyéthylénés (78 OE), les triglycérides d'acide stéarique et hydroxystéarique (40 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol (100 OE), l'alcool dodécanediol polyglycérolé (3,5 moles), l'octyl-2 dodécanol oxyéthyléné (250 OE), l'alcool stéarylique oxyéthyléné (100 OE), l'alcool oléique oxyéthyléné (50 OE), le di-oléate de polyéthylène glycol (50 OE), le palmitate de glycérol oxyéthyléné (200 OE), le tri-isostéarate de sorbitane oxyéthyléné (160 OE), le tri-isostéarate de sorbitane oxyéthyléné (200 OE), le stéarate de polyéthylène glycol (150 OE), le di-oléate de méthyl glucose oxyéthyléné (120 OE), le tétra-stéarate de penta-érythrityle oxyéthyléné (150 OE), le di-oléate de polyéthylène glycol (55 OE), l'undécylénate de polyéthylène glycol (300 OE), le di-stéarate de polyéthylène glycol (150 OE),
16. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 15, caractérisé en ce que le tensioactif émulsionnant est choisi parmi le mono-undécylénate de glycérol oxyéthyléné (7 OE), le monostéarate de glycérol oxyéthyléné (15 OE), le mono-laurate de glycérol oxyéthyléné (20 OE), le di-laurate de glycérol oxyéthyléné (20 OE), le stéarate de di-glycérol oxyéthyléné (4 OE), le cocoate de glycérol oxyéthyléné (7 OE), le pyrrolidone carboxylate de monoisostéarate de glycérol oxyéthyléné (25 OE), le mono stéarate de glycérol oxyéthyléné (20 OE), le mono-stéarate de glycérol oxyéthyléné (30 OE), le stéarate de di-glycérol oxyéthyléné (4 OE), les mono- et di-glycérides de coprah oxyéthyléné (30 OE), le lanolate de sorbitane oxyéthyléné (40 OE), le mono-oléate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le tri-oléate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le mono-palmitate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le mono-stéarate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), l'undécylénate de sorbitane oxyéthyléné (20 OE), l'undécylénate de sorbitane oxyéthyléné (18 OE), l'hexastéarate de sorbitane oxyéthyléné (6 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (44 OE), le tétra-oléate de sorbitane oxyéthyléné (30 OE), le mono-stéarate de sorbitane oxyéthyléné (4 OE), l'oléate de sorbitane oxyéthyléné (40 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (4 OE), le mono-laurate de sorbitane oxyéthyléné (10 OE), le tétra-oléate de sorbitane oxyéthyléné (40 OE), le cocoate de butyl glucoside oxyéthyléné (3 OE), le di-stéarate de méthyl glucose oxypropyléné (20 OE), le mono-laurate de méthyl glucoside oxyéthyléné (20 OE), le benzoate de méthyl glucose oxyéthyléné (20 OE), les esters de tri-glycérides de ricin et de saccharose oxyéthylénés (1,4 OE), les esters de tri-glycérides de ricin et de saccharose oxyéthylénés (2 OE), le sesquistéarate de méthyl glucose oxyéthyléné (20 OE), le di-stéarate de méthyl glucose oxyéthyléné (20 OE), le mono-stéarate de butanediol oxyéthyléné (4 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol oxyéthyléné (50 OE), le di-stéarate de polyéthylène glycol, le myristate de polyéthylène glycol (8 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol (8 OE), le mono-stéarate de polyéthylène glycol (20 OE), le laurate de polyéthylène glycol (6 OE), le di-stéarate de polyéthylène glycol (8 OE), le di-laurate de polyéthylène glycol (8 OE), le mono-oléate de polyéthylène glycol (8 OE), le di-heptanoate de tétra-éthylène glycol, le di-oléate de polyéthylène glycol (8 OE), l'oléate de polypropylène glycol (26 OE), le di-polyhydroxystéarate (6 hydroxy) de polyéthylène glycol (30 OE), le stéarate de polyéthylène glycol (40 OE), le di-laurate de polyéthylène glycol (8 OE).
17. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend :
 - (a) 2 à 15% en poids d'au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique,
 - (b) 2 à 15% en poids d'au moins un tensioactif épaississant non-ionique.
18. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend 3 à 12% en poids d'au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique.
19. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B a une viscosité Brookfield comprise entre 10 et 150 mPa.s.
20. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse

B comprend de 3 à 6% en poids d'au moins un tensio-actif épaississant.

21. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend au moins un alkylpolyglucoside comme tensio-actif non-ionique.

5

22. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend 0,01 à 15% en poids d'au moins un alkylpolyglucoside.

23. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition aqueuse B comprend au moins un tensioactif amphotère.

10

24. Dispositif selon la revendication 23, caractérisé en ce que le tensioactif amphotère est présent dans la composition aqueuse B en quantités allant de 0,01 à 15% en poids.

15

25. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que B comprend :

- 1 à 25% en poids d'au moins un tensioactif émulsionnant non-ionique,
- 1 à 30% en poids d'au moins un tensioactif épaississant non-ionique,
- 0,01 à 10% en poids d'au moins un alkylpolyglucoside,
- 0,01 à 15% en poids d'au moins un tensioactif amphotère.

20

26. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition comprend une eau minérale ou une eau thermale.

25

27. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition comprend en outre au moins un adjuvant choisi parmi: les conservateurs, les antioxydants, les parfums, les filtres, les matières colorantes, les actifs hydrophiles ou lipophiles.

28. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition comprend en outre au moins un α -hydroxy-acide.

30

29. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition comprend en outre au moins un anti-oxydant choisi parmi les sulfites.

35

30. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la composition est adaptée au nettoyage et au soin de la peau humaine.

40

45

50

55



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 97 40 0242

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	EP 0 577 506 A (L'ORAAL) * page 5 - page 7; revendications * ---	1-30	A61K7/00 A61K7/50
A	WO 93 09761 A (RICHARDSON-VICKS INC.) * page 19 - page 21; revendications * ---	1-30	
A	EP 0 304 713 A (WELLA AKTIENGESELLSCHAFT) * page 5 - page 6; revendications * ---	1-30	
A	EP 0 213 827 A (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) * page 7; revendications * ---	1-30	
A	EP 0 194 097 A (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) * revendications * ---	1-30	
A	US 5 156 833 A (TAKAO OSUGI ET AL) * colonne 4; revendications * ---	1-30	
A	US 5 167 950 A (CLAUDIO L. K. LINS) * colonne 19 - colonne 22; revendications * ---	1-30	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
A	EP 0 586 295 A (NLN) * page 9 - page 10; revendications * ---	1-30	A61K
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 12, no. 467 (C-550) [3314] , 7 Décembre 1988 & JP 63 185911 A (KANEBO LTD), 1 Août 1988, ---	1-30	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 339 (C-624) [3687] , 31 Juillet 1989 & JP 01 117817 A (POLA CHEM ND INC) ---	1-30	
		-/--	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lien de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 18 Juin 1997	Examinateur Luyten, H
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande
EP 97 40 0242

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	AU 627 666 A (YARDLEY & COMPANY) * page 13 - page 16; revendications *	1-30	
D,A	WO 95 05796 A (UNILEVER NV) * page 13 - page 14; revendications *	1-30	
D,A	CA 1 002 256 A (BRISTOL-MYERS CANADA LIMITED) * page 15 - page 16; revendications *	1-30	
D,A	US 5 429 815 A (JOSEPH R. FARYNIARZ ET AL) * colonne 10 - colonne 12; revendications *	1-30	
D,A	& EP 0 676 188 A (CHESEBROUGH-POND'S USA CO.,) -----		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
LA HAYE		18 Juin 1997	Luyten, H
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			